

Desinfektionsmaßnahmen und Fahrzeugstandzeiten nach Infektionsfahrten (lt. Rahmenhygieneplan Nordsachsen)

Krankheit	Hand- schuhe	Mund-Nasen- Schutz		Overall mit Schutzbrille	Desinfektionsmaßnahmen		
		Personal Mind. FFP 2	Patient Mind. FFP 1		Kontaminierte Flächen/Geräte	Gesamter Raum	Verdampfen
AIDS	X			X	5 min vor Ort		
Anthrax	X doppelt	FFP 3	X	X + Überschuhe			30 min bis 6 h BF Leipzig
Atemwegsinfektion (außer TBC)	X	X	X		5 min vor Ort		
Borreliose	X				5 min vor Ort		
Botulismus	X				5 min vor Ort		
Candida (Hefepilz)	X				5 min vor Ort		
Cholera	X			X		30 min Rettungswache	
Clostridium difficile (CDAD)	X			X		30 min Rettungswache	
Creuzfeld - Jakob	X			X	5 min vor Ort		
Diphtherie	X	X	X	X		30 min Rettungswache	
Durchfall-infektiös (Norovirus)	X	X	X	X		30 min Rettungswache	
Escherichia coli	X				5 min vor Ort		

Enteritis infectiosa (Erreger unbekannt)	X				15 min vor Ort		
EHEC	X			X	5 min vor Ort		
Erysipel	X			X	5 min vor Ort		
Gasbrand	X			X		30 min Rettungswache	
Hämorrhagisches Fieber, Ebola-, Lassa-, Marburg-, Krim-Kongo-Virus, Pocken, Affenpocken	X doppelt	FFP 3	X	X + Überschuhe			30 min bis 6 h BF Leipzig

Krankheit	Hand-schuhe	Mundschutz FFP		Overall mit Schutzbrille	Desinfektionsmaßnahmen		
		Personal	Patient		Kontaminierte Flächen/Geräte	Gesamter Raum	Verdampfen
Hepatitis A, E	X			X		30 min Rettungswache	
Hepatitis B, C, D	X			X	5 min vor Ort		
Herpes Zoster (Gürtelrose)	X				15 min vor Ort		
Influenza epidemica (Virusgrippe), Vogelgrippe, Schweinegrippe	X	X	X	X	5 min vor Ort		
Keratoconjunctivitis epidemica Konjunktivitiden durch Adenoviren	X		X			30 min Rettungswache	
Keuchhusten (Pertussis)	X	X	X	X	5 min vor Ort		
Legionärskrankheit	X	X	X		5 min vor Ort		

Lues (Syphilis)	X				5 min vor Ort		
Lungenpest/ Pest	X doppelt	X FFP 3	X	X+ Überschuhe		X	30 min bis 6 h BF Leipzig
Malaria	X				10 min vor Ort		
Masern (Morbilli)	X	X	X	X		30 min Rettungswache	
Meningitis FSME	X	X	X	X		30 min Rettungswache	
Milzbrand (Lunge Anthrax, Sporen)	X doppelt	X FFP 3	X	X+ Überschuhe		X	30 min bis 6 h BF Leipzig
Mononucleosis infectiosa (Pfeiffer-Drüsenfieber)	X	X	X	X	5 min vor Ort		

Krankheit	Hand- schuhe	Mundschutz FFP		Overall mit Schutzbrille	Desinfektionsmaßnahmen		
		Personal	Patient		Kontaminierte Flächen/Geräte	Gesamter Raum	Verdampfen
Multiresistenter Erreger ➤ 3 MRGN ➤ 4 MRGN ➤ ESBL ➤ MRSA ➤ VRE	X	X	X	X	5 min vor Ort		
Parotitis epidemica (Mumps)	X	X	X	X	5 min vor Ort		
Poliomyelitis (Kinderlähmung)	X	X FFP 3	X	X		30 min Rettungswache	
Rabies (Tollwut)	X	X FFP 3	X	X		30 min Rettungswache	
Rotaviren	X	X		X		30 min Rettungswache	
Rubeola (Röteln)	X	X	X	X	5 min vor Ort		
Salmonellose	X			X	5 min vor Ort		
Scabies (Krätze)	X			X		30 min Rettungswache	
Scharlach	X	X	X	X	5 min vor Ort		
SARS (Coronaviren)	X	X	X	X	5 min vor Ort		
Shigellose (Bakterienruhr)	X			X	5 min vor Ort		
Tetanus	X			X	5 min vor Ort		
Tuberkulose (TBC)	X	X FFP 3	X	X	5 min vor Ort		
Typhus, Paratyphus abdominalis	X			X	5 min vor Ort		
Varizella zoster/ Windpocken	X	X	X	X	10 min vor Ort		

Vom angegebenen Desinfektionsmittel kann nur dann abgewichen werden, wenn sich die Fahrzeugstandzeit dadurch nicht verlängert.